

Information für Ihren Arzt oder zur Mitnahme zu labors.at

(Bitte drucken Sie dieses Informationsblatt aus und nehmen Sie es mit zu Ihrem Arzt oder zu labors.at)

Testname: ALDO+PA (Hypertonie-Diagnostik) - *Zur Abklärung von primärem Aldosteronismus bei Bluthochdruck*

Kosten: €183,20 (nicht von GKK gedeckt, evtl. privat erstattbar)

Bearbeitungszeit: ca. 14 Tage

Labors.at-Analysennummer: RAASAAA

Patientenname: _____

Geburtsdatum: _____

Grund für die Testung:

- ☐ Therapie-resistenter oder unkontrollierter Bluthochdruck
- ☐ Bluthochdruck Grad 2 oder 3
- ☐ Hypokaliämie / niedrige Kaliumwerte
- ☐ Vorhofflimmern
- ☐ Obstruktive Schlafapnoe (OSA)
- ☐ Adrenales Inzidentalom
- ☐ Familiäre Vorgeschichte von PA oder frühem Schlaganfall
- ☐ Bluthochdruck < 40 Jahre
- ☐ Andere: _____

Ergebnisübermittlung: ☐ Arzt ☐ Patient

Behandelnder Arzt: _____

Anweisungen für Ärztepraxen:

Bitte führen Sie eine Blutentnahme (mind. 0,5 ml Serum, Standard Serum-Röhrchen) morgens, vor der Einnahme der täglichen Medikation durch. Es ist nicht notwendig, dass der Patient die laufende Therapie und Medikation absetzt.

Die Probe kann entweder in der Praxis entnommen und an labors.at gesendet werden, oder der Patient wendet sich für die Blutabnahme direkt an einen labors.at Standort:

Die Analyse erfolgt mittels Massenspektrometrie auf:

Angiotensin I (Ang I)

Angiotensin II (Ang II)

Aldosteron (ALDO)

→ Bestimmung des Aldosteron-Angiotensin-II-Ratios (AA2-Ratio) als Screening-Test für primären Aldosteronismus.

aTENSION.life

Precision in Hypertension

Brehmstraße 14a, 1110 Vienna, Austria

www.aTENSION.life